



JABUKA

Tradicionalni plan đubrenja

Sadnice i mlada drva

Vreme primene	Proizvod	Količine	Beleške
Period oranja	ITALPOLLINA 4-4-4	3T/Ha	Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta. Bolje zadržavanje vode
Sadnja	AEGIS IRRIGA	1,5 Kg/Ha	Mikorizni inokulum
Nakon presađivanja	GUANITO 6-15-3	0,6Ton/Ha	Poboljšava korenov sistem, organski fosfor se odpušta sporo
Tokom rasta	SCUDO	1L/Ha	Efekat protiv erwinia i venturia, u kombinaciji sa kontaktnim bakrom
U slučaju nedostatka gvožđa	MYR Chlorosys + REVIVE 4,8	3L/Ha x 3app + 5 Kg/Ha/nedeljno	Koristiti kombinaciju oba u slučaju ozbiljnog nedostatka
Bilo koji abiotski ili biotski problem	TRAINER	3L/Ha	TRAINER ima antistrsni efekat
Nakon cvetanja	SCUDO	2L/Ha	Pomaže u borbi protiv venturie
Septembar	MYR MICRO	4L/Ha	Sadrži Fe, Bor,Mn,Zn. Ukoliko je moguće dve primene

Stabla u proizvodnji

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Februar/Mart	DIX 10-3-3 ili ITALPOLLINA 4-4-4 + CERBERO Calcium Nitrate	0,4 T/Ha ili 0,8 T/Ha + 0,15 T/Ha	Organski azot poboljšava hranjivi status biljke I sprečava preteran rast
Etapa B,C i D Etapa cvetanja	SCUDO FIT One	1,5L/Ha/Primena ili 3L/Ha	Efekat protiv erwinia i venturia, u kombinaciji sa kontaktnim bakrom
Etapa D	REVIVE 4,8	5Kg/Ha	U slučaju ozbiljnog nedostatka 2primene
Početak cvetanja	AUXYM + MYR Calcium Boron Or MYR MICRO	0,75L/Ha/Primena + 2L/Ha/Primena ili 3L/Ha/Primena	Poboljšava zamatanje plodova, povećava prinos. 3 primene, jedna pre cvetanja, jedna nakon cvetanja, jedna nakon zamatanja plodova
Nakon cvetanja	MYR Mg	2L/Ha/Primena	Nedostak magnezijuma. Minimum 3 primene
Ukoliko ima neki stres ili sa pesticidima	TRAINER	2L/Ha/Primena	U slučaju stresa
Jun	PHENIX 6-8-15SK +3MgS ili 12/5/15SK ili CERBERO 15/5/30	300Kg/Ha ili 200Kg/Ha ili 150Kg/Ha	Za prinos, u nekoliko primena ukoliko se koristi CERBERO
Sredina Juna	MYR Calcium Boron	3L/Ha	Da bi se izbegle gorke pege, dodati sa svakim tretiranjem pesticida
Kraj Jula	PHENIX 6-8-15SK +3MgS ili 12/5/15SK ili CERBERO 15/5/30	300Kg/Ha ili 200Kg/Ha ili 150Kg/Ha	Za prinos, u nekoliko primena ukoliko se koristi CERBERO
Nakon berbe	MYR Chlorosys + TRAINER	5L/Ha/Application + 5L/Ha	1 primena
Pre opadanja lišća	Urea	10Kg/Ha	U slučaju venturie
Kad je opalo lišće	SCUDO	2L/Ha	