

Simptomi - bolest se po nakovrdžanom lišću lako prepoznaje. Po završetku listanja pojedini listovi postaju nakovrdžani, mjehuravi i zadebljali, često veći od normalnih listova i lako se lome. Ovisno o sorti, nakovrdžani dijelovi lista mogu biti zelenobijele ili crvene boje. Ubrzo se nakovrdžani listovi osuše i otpadnu. Uzročnik kovrdžavosti lista je gljiva *Taphrina deformans*.



Nektarina prije tretiranja.



Bolest je zahvatila tri stabla nektarine. Tretiranje je rađeno dezinfekcionim sredstvom **Dioxy Activ Supra AGRO** u koncentraciji 1:300. Prvo tretiranje je rađeno 10.07.2015, drugo 13.07.2015., treće 14.07.2015. i četvrto 20.07.2015. Tretiranjem dva uzastopna dana, je dokazano da sredstvo neće uništiti voćku, ni naškoditi joj. Prilikom svakog tretiranja potrošeno je 3 litre rastvora.

Nakon četvrtog tretiranja tj. za samo 10 dana mogla se uočiti razlika u bujnosti. Novi izboji su potpuno zdravi, pa je time *Taphrina deformans* uspješno suzbijena.



Nektarina nakon posljednjeg tretiranja.

