

# Melon and Watermelon

Italpollina fertilization plan... more yield more quality

## LUBENICA Tradicionalni plan đubrenja

Lubenica zahteva veliku količinu Kalijuma da bi dala kvalitetne plodove. Organsko đubrenje je vrlo korisno jer unošenjem N, P, K, elemenata u tragovima, organske supstance, huminske kiseline, aminokiselina mi podstičemo razvoj i zdravstveno stanje biljke. Takođe pomaže siromašnim zemljištima da dođe do njihovog zaslanjivanja. Azot je potreban (pre rasađivanja i tokom razvoja) da bi se dobili dobri kvantitativni i kvalitativni rezultati. Preporučljivo je uneti azot u organskom obliku pre rasađivanja i u kasnijim etapama (fertirigacijom) ukoliko je potrebno. Biljne aminokiseline i peptidi, folijarno, poboljšavaju rast biljaka i valitet ploda.

| Vreme primene                                  | Proizvod  | Doze  | Beleške  |
|--|---|---|--|
| Period oranja                                  | <b>ITALPOLLINA</b>  | 1.0 – 1.2 tona/ha   | Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta.   |
| Pre rasađivanja<br>- U redovima                | <b>DUETTO NPK 3-3-7</b>   | 1.0 – 1.2 tona/ha   | Pruža N, P, K, Ca, Mg, elemente u tragovima I organsku supstancu   |
| Nakon rasađivanja                              | <b>OASI STARTER</b><br>(fertirigacija)<br><br>+<br><b>TIFI</b><br><br>+<br><b>AEGIS IRRIGA</b>    | 15 L/ha<br>3 Puta<br><br>+<br>2 Kg/Ha<br><br>+<br>2 Kg/Ha | Starter efekat i acidifikacija zemljišta<br>Stimulacija korena<br><br>Da bi se povećao prinos i otpornost na patogene gljive |
| Cvetanje                                       | <b>AUXYM</b><br>+<br><b>MYR Ca B</b>  | 0,7 L/Ha<br>+<br>3 L/Ha                                   | Bolje zametanje plodova, samim tim veći prinos.  |
| Tokom vegetativnog razvoja (ponoviti 2-4 puta) | <b>MYR Chlorosis</b><br>Tečno đubrivo sa mikroelementima (gvožđe, bor...) +<br><br><b>TRAINER</b> | 3 L/ha<br><br>3 L/ha                                      | Folijarna primena.<br>Veći prinosi i kvalitet  |

|              |                        |                         |   |
|--------------|------------------------|-------------------------|---|
| Tokom rasta  | <b>Cerbero 15-5-30</b> | 20-50<br>Kg/Ha/Nedeljno | U zavisnosti od<br>navodnjavanja I<br>očekivanog prinosa            |
| Rast plodova | <b>MYR K</b>           | 3-5 L/ha                | Folijarna primena.<br>Ponoviti 2-3 puta.<br>Bolji prinos i kvalitet |

