

CUCURBITA (tikvica, krastavac, ...)

Tradicionalni plan đubrenja

Uzgoj Cucurbitaceae generalno zahteva veliku količinu N, P, K da bi se dobio dobar prinos; ima velike razlike između uzgoja pod plastenikom i na otvorenom polju. Organsko đubrenje je uvek vrlo korisno zbog unošenja N, P, K, elemenata u tragovima, organske supstance, huminskih kiselina, aminokiselina koje podstiču razvoj biljke i njeno zdravstveno stanje. Takođe poboljšava siromašna zemljišta i sprečava njihovo zaslanjivanje (koji je glavni problem kod hemijskih đubriva.

CUCURBITA POD STAKLENIKOM:

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Period oranja/ Pre rasađivanja	ITALPOLLINA 4-4-4	3T/Ha	Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta. Povećava vodni kapacitet
Nakon rasađivanja	OASISTARTER	15 L/Ha/Nedelja	3 primene poboljšavaju korenov sistem
Sadnja ili neposredno pre plastike	TIFI + AEGIS IRRIGA	3 Kg/Ha + 2 Kg/Ha	Povećava rod i otpornost na patogene gljive
Rano cvetanje ili bilo koji biotski ili abiotski problem	TRAINER	3L/Ha	TRAINER ima anti-stres efekat
Rano cvetanje	CERBERO 15-5-30 +OE	50-100Kg/Ha/Nedelja	Povećava prinos
Cvetanje	AUXYM + MYR Ca B	0,5L/Ha/primena + 3L/Ha	Poboljšava zamatanje plodova, samim tim i prinos.
Zaštita	SCUDO i/ili FIT ONE	1 do 2L/Ha sa kontaktnim bakrom ili hemijskim proizvodom i/ili 3L/Ha	Povećava otpornost na plamenjaču I bakteriozu

Tokom rasta	MYR Chlorosis	2,5 L/Ha	U slučaju hloroze
-------------	----------------------	----------	-------------------

