

Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na bazi hlordioksida

Primena preparata Dioxy Activ Supra AGRO tokom uzgoja maline

Dezinfekcija zemljišta preparatom Dioxy Activ Supra AGRO

Dezinfekcija zemljišta predstavlja neophodnu aktivnost u svim slučajevima kada se na istom mestu tokom više godina organizuje produkcija samo jedne kulture, kao što je na primer: jagoda, paprika, paradajz i slično. Dezinfekcijom zemljišta preparatom Dioxy Activ Supra AGRO eliminisat će se prenos bolesti od ranijih kultura koje su uzgajane na istoj parceli.



Proizvod Dioxy Activ Supra AGRO razblažiti sa vodom u odnosu 1:300 (1 l proizvoda na 300 l vode). Na površinu naneti određenu količinu ovako pripremljenog rastvora.

Površina	Količina pripremljenog rastvora	Potrebna količina Dioxy Activ Supra AGRO
100 m ²	60 l	200 ml
1 dulum	600 l	2 l
1 ha	6000 l	20 l

Dezinfekcija zemljišta preparatom Dioxy Activ Supra AGRO pre sadnje maline ima niz prednosti, a to su:

- brzo i učinkovito uništavanje svih vrsta patogenih organizama (bakterije, viruse, gljivice, alge);
- bolje razvijanje korena, unutar dezinfikovanog zemljišta, što pruža postizanje maksimalnih prinosa maline;
- nema ograničenja u pogledu vremenskog perioda ulaska na tretirane površine niti karence;
- prilikom primene nije potrebna zaštitna oprema aplikatora.



Dezinfekcija alata i opreme koji se koriste prilikom sadnje i rezidbe

Dezinfekcija alata i opreme ima posebnu važnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Makaze koje se koriste u rezidbi, obavezno se moraju dezinfikovati prilikom prelaska sa jedne parcele na drugu. Veliki broj bolesti i štetočina upravo se prenosi putem alata i opreme.

Dioxy Activ Supra AGRO razblažiti sa vodom u odnosu od 1:1000 (10ml na 10 l vode) do 1:500 (20ml na 10 l vode). Ovako pripremljenim rastvorom naprskati ili u njega potopiti alat i opremu. Nakon tretiranja dezinfikovani alat i oprema se odmah mogu nastaviti koristiti.



Dezinfekcija sadnica preparatom Dioxy Activ Supra AGRO

Zreli izdanci golih žila pre sadnje zahtevaju poseban tretman, a to je potapanje sadnica u rastvor dezinfekcionog sredstva Dioxy Activ Supra AGRO u trajanju od 3-5 minuta. Ovo je važno radi zaštite sadnica od patogena, te za osvežavanje sadnica. Preparat razblažiti sa vodom u razmeri 1:500 (20 ml na 10 l vode).



Sadnice kontejnerskog tipa se zalivaju, prskaju ili potapaju u pripremljen rastvor Dioxy Activ Supra AGRO i vode. Rastvor pripremiti 1:500 (1 l preparata na 500 l vode).



Zdravstveno ispravne sadnice predstavljaju ključ uspeha u produkciji plodova.


Dezinfekcija malinjaka pred vegetaciju

Da bismo parcelu bolje pripremili za nestabilne vremenske prilike, preporuka je zaštitu u proleće uraditi dva puta! Na taj način ćemo malo usporiti vegetaciju i eliminisati razvoj različitih patogena. Na parcelama gde je u predhodnoj sezoni dolazilo do sušenja preporučuje se površinski, kao i na donji deo izdanka aplicirati preparat Dioxy Activ Supra AGRO. Preparat razblažiti sa vodom 1:500 (1 l sredstva na 500 l vode).

Dezinfekcija vode prilikom navodnjavanja



Izvorska, voda iz bunara, bušotina, a posebno ona iz površinskih vodotokova u sebi sadrži veliki broj mikroorganizama koji mogu dovesti do neželjenih posledica u poljoprivrednoj proizvodnji. Dezinfikovana voda korištena za zalijevanje biljaka predstavlja jednu od bitnih karika u lancu poljoprivredne proizvodnje. Za dezinfekciju vode preparat dozirati u odnosu od 1:10000 (100 ml sredstva na 1000 l vode) do 1:20000 (50 ml sredstva na 1000 l vode).



Preventivna dezinfekcija malinjaka posle većih padavina

Preventivna dezinfekcija malinjaka nakon većih kiša je jako bitna mera prilikom uzgoja maline. Preventivnom dezinfekcijom sa preparatom Dioxy Activ Supra AGRO, mogu se sprečiti neke od uobičajnih bolesti maline, kao što su fitoftora, didimela ili botritis. Prilikom primene preparat razblažiti sa vodom u odnosu 1:500, te oprskati malinu preko listova ili pripremljenim rastvorom izvršiti zalivanje malinjaka ručno ili putem sistema za navodnjavanje tipa kap po kap.

Dezinfekcija malinjaka ukoliko dođe do pojave bolesti

Ukoliko dođe do pojave bolesti kao što su trulež korena (fitoftora), didimela, verticilium, botritis kao i druge bolesti maline gde su uzročnici (virusi, gljivice i baktrije) preparat Dioxy Activ Supra AGRO je vrlo efikasan. Kod fitoftore vrši se zalivanje zemljišta u rednom prostoru rastvorom pripremljenim razblažnjem sa vodom u odnosu 1:300 u dva odvojena termina. Dok se kod ostalih bolesti tretira nadzemni sistem maline rastvorom pripremljenim razblažnjem sa vodom u odnosu 1:300, odnosno 1 l sredstva na 300 l vode.





Dezinfekcija plodova, ambalaže i ruku prije berbe

Plodovi maline predstavljaju pogodan medij za razvoj različitih vrsta patogenih organizama.

Preparat Dioxy Activ Supra AGRO ne poseduje ograničenja kada je u pitanju dezinfekcija plodova.

Da bi plodovi maline ostali što duže u svežem stanju i nakon berbe potrebno ih je dezinfikovati sa preparatom Dioxy Activ Supra AGRO.



Dezinfekciju plodova maline vrši se još u malinjaku i to pred berbu. Ukoliko se plodovi beru u jutarnjim satima malinjak naprskati dan pre u večernjim satima sa preparatom i to u koncentraciji 1:400 (1 ml sredstva na 1 l vode). Ukoliko je berba maline u večernjim satima tretiranje obaviti rano ujutro istog dana.

Nakon tretiranja plodovi maline su odmah spremni za upotrebu, jer je ovo ekološki prihvatljiv preparat koji je siguran za upotrebu, nema opasnosti od trovanja ljudi i životinja.

Ambalažu u koju se beru plodovi potrebno je dezinfikovati sa preparatom Dioxy Activ Supra AGRO. Preparat razblažiti sa vodom u razmeri 1:500, te naprskati ambalažu.



Jedan od najčešćih medija putem kojeg se prenosi veliki broj patogenih mikroorganizama za biljke, ljude i životinje predstavljaju ruke. Zbog toga ekološki prihvatljiv preparat, sa visokim stepenom sigurnosti za upotrebu, bez izazivanja neželjenih reakcija, iritacija, opekotina, ukoliko se primeni prema uputstvu, preparat Dioxy Activ Supra AGRO predstavlja jedno od najboljih rješenja.

Preparat razblažiti sa vodom u odnosu 1:1000 (1 ml na 1 l vode). Na suhe i prethodno oprane ruke naneti 3 - 5 ml ovako pripremljenog rastvora, dobro ga utrljati i ostaviti ruke da se osuše.

