



## BOROVNICA

### Tradicionalni plan đubrenja

### Sadnice ili mlada drveća

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Period oranja	<b>ITALPOLLINA 4-4-4</b>	3T/Ha	Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta. Bolie zadržavanje vode
Nakon rasađivanja	<b>GUANITO</b> + <b>OASI STARTER</b>	0,5T/Ha + 15 L/Ha/Nedeljno	3 primene povećava I poboljšava korenov sistem. Nizak pH
Bilo koji biotski ili abiotiski problem	<b>TRAINER</b>	3L/Ha	TRAINER antistresni efekat
Nedostatak gvožđa	<b>MYR CHLOROSIS</b>	3 to 5L/Ha	Ponoviti 3 primene

Beleške: doze se odnose na zemljišta sa prosečnom plodnošću.

## BOROVNICA u proizvodnji

Vreme primene	Proizvod	Doza	Beleške
Posle zime ukoliko je moguće	<b>ITALPOLLINA</b>	3 Ton/Ha	Italpollina poboljšava zemljište, specijalan sastav kalijum sulfata je zanimljiv za borovnicu
Vegetativni oporavak	<b>OASI Starter</b>	15L/Ha 2 puta	Stimulacija razvoja korena
Pre cvetanja	<b>MYR Calcium BORON + TRAINER</b>	3L/Ha x 2 primena + 3 L/Ha	Sprečava nedostatak bora, bor poboljšava zametanje plodova
Bilo koji abiotski stres	<b>TRAINER</b>	5 L/Ha	Klimatski stres, mraz npr.
U fazi berbe	<b>CERBERO 15-5-30</b>	50 Kg/Ha/nedeljno	Tokom berbe
Nakon berbe	<b>MYR CHLOROSIS</b>	3 L/Ha	2 primene nakon berbe, sadrži gvožđe i bor.

