

| USEV | KOLIČINA | VREME PRIMENE |
|--------------------|------------|--|
| Paradajz i paprika | 1-2 kg/ha | 3 primene; 4-6 listova, zametanje i rast plodova |
| Krompir | 1-2 kg/ha | 3 primene, 2-5 nedelja nakon formiranja krtola i 2-3 nedelje pre berbe |
| Jabuka | 0,5-1kg/ha | 3 primene, pre cvetanja, tokom deobe ćelija i rasta plodova |
| Kukuruz | 2-3 kg/ha | 2 primene; 4-6 nesavijenih listova i početak reproduktivne faze |
| Soja | 2-3 kg/ha | 2 primene; 5 internodija i početak reproduktivne faze |
| Žitarice | 2-3 kg/ha | 1 primena pri fazi klasanja |
| Grožđe | 1-2kg/ha | 3 primene; pre cvetanja, zametanje bobica i zatvaranje bobica |
| Borovnica | 1-2 kg/ha | 1 primena pri cvetanju |
| Uljana repica | 1-2 kg/ha | 3 primene; razvoj pupoljaka, razvoj semena |
| Dinja | 1-2 kg/ha | 3 primene; prvo cvetanje, 2-3 nedelje i 5-6 nedelja kasnije |
| Lubenica | 1-2 kg/ha | 3 primene; pri etapi 4-6 listova, 6-8 listova i u cvetanju |
| Luk | 1-2 kg/ha | 1 primena tokom rasta plodova |
| Kupus | 1-2 kg/ha | 2 primene; pri etapi 4-6 listova i 2-3 nedelje kasnije |
| Brokoli | 1-2 kg/ha | 3 primene; pri etapi 4-6 listova i pre zatvaranja reda |
| Mrkva | 1-2 kg/ha | 3 primene; pri etapi 4-6 listova; širenje korena i 2 nedelje kasnije |

Koristiti najmanje 500 l/ha da bi se obezbedila dovoljna pokrivenost lišća. Nikada ne prelaziti preporučene doze od 0,5% (0,5 kg po 100 litara vode). Nikada ne prskati tokom jake osunčanosti ili perioda sa visokom evapotranspiracijom da bi se sprečile ožegotine na lišću. Preporučeno je koristiti rastvor u roku od 2-3 dana. GL formulacija se takođe može koristiti za fertirigaciju. Generalna primena od 0,2-1 kg po 1000 litara vode.